

使用上の注意改訂のお知らせ

2024年6月

処方箋医薬品^{注)}

HMG-CoA 還元酵素阻害剤 ◎高脂血症治療剤◎

日本薬局方 シンバスタチン錠

リポバス[®]錠 5

リポバス[®]錠 10

リポバス[®]錠 20

注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂しましたのでお知らせいたします。

今後のご使用に際しましては最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

弊社製品のご使用にあたって、副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

オルガノン株式会社

《改訂概要》

改訂項目	改訂内容
10. 相互作用 10.1 併用禁忌	『スタリビルド』を削除しました。

- ・今回の改訂内容は医薬品安全対策情報（DSU）No.327（2024年7月）に掲載されます。
- ・改訂後の電子添文全文は、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/>）ならびに弊社ホームページ（<https://organonpro.com/jp-jp/>）に掲載しております。
- ・添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、PMDAホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。



《改訂内容》

リポバス錠 5/錠 10/錠 20

改訂後			改訂前		
10. 相互作用			10. 相互作用		
10.1 併用禁忌（使用しないこと）			10.1 併用禁忌（使用しないこと）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
(略) (変更なし)			(略)		
アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビシタットを 含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、 本剤の代謝が抑制さ れる。	アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸 塩： インビラーゼ コビシタットを 含有する製剤： <u>スタリビルド</u> ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4参照]	横紋筋融解症を含む ミオパチー等の重篤 な副作用が起きるお それがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、 本剤の代謝が抑制さ れる。

()部：削除

《改訂理由》

【自主改訂】

10. 相互作用

10.1 併用禁忌

販売中止された『スタリビルド』を削除しました。

製品情報お問い合わせ先

オルガノン株式会社
東京都港区南青山1-24-3

オルガノン カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-095-213
<受付時間>9:00~17:30 (土日祝日・当社休日を除く)

2024年6月
改訂連絡番号：24-04