

使用上の注意改訂のお知らせ

2026年3月

処方箋医薬品^{注)}

HMG-CoA還元酵素阻害剤 ◎高脂血症治療剤◎

日本薬局方 シンバスタチン錠

リポバス[®]錠 5/錠 10/錠 20

注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂しましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しましては最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。弊社製品のご使用にあたって、副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

オルガノン株式会社

《改訂概要》

改訂項目	改訂内容
2. 禁忌	医薬安通知*に基づき、2.4項の併用禁忌の薬剤名に『セリチニブ』を追記しました。
10. 相互作用 10.1 併用禁忌	医薬安通知*に基づき、10.1併用禁忌の項の薬剤名に『セリチニブ（ジカディア）』を追記しました。

*2026年3月17日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知（医薬安通知）

- ・ 今回の改訂内容は医薬品安全対策情報（DSU）No.344（2026年4月）に掲載されます。
- ・ 改訂後の電子添文全文は、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/>）ならびに弊社ホームページ（<https://organonpro.com/jp-jp/>）に掲載しております。
- ・ 添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下のGS1バーコードを読み取ることで、PMDAホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。



《改訂内容》

リポバス錠 5 / 錠 10 / 錠 20

改訂後	改訂前												
<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>2.1～2.3 略（変更なし）</p> <p>2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、コビシスタットを含有する製剤、<u>セリチニブ</u>を投与中の患者 [10.1 参照]</p>	<p>2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）</p> <p>2.1～2.3 略</p> <p>2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、コビシスタットを含有する製剤を投与中の患者 [10.1 参照]</p>												
<p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ <u>セリチニブ</u>： <u>ジカディア</u> [2.4 参照] </td> <td> 横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。 </td> <td> これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。 </td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ <u>セリチニブ</u> ： <u>ジカディア</u> [2.4 参照]	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。	<p>10. 相互作用</p> <p>10.1 併用禁忌（併用しないこと）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>薬剤名等</th> <th>臨床症状・措置方法</th> <th>機序・危険因子</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照] </td> <td> 横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。 </td> <td> これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。 </td> </tr> </tbody> </table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ <u>セリチニブ</u> ： <u>ジカディア</u> [2.4 参照]	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。											
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子											
アタザナビル： レイアタツツ サキナビルメシル酸塩： インビラーゼ コビシスタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ [2.4 参照]	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤はCYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。											

（ ___部：医薬安通知）

《改訂理由》

【医薬安通知に基づく改訂】

2. 禁忌

10. 相互作用 10.1 併用禁忌

強力な CYP3A4 阻害剤である『セリチニブ』がシンバスタチンの代謝を抑制し、横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがあることから、追記しました。

製品情報お問い合わせ先

オルガノン株式会社
東京都港区南青山1-24-3

オルガノン カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-095-213
<受付時間>9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）

2026年3月
改訂連絡番号：26-01