

プロペシア®錠
服薬ガイド



【エージェー】

AGA、エージェーとはAndrogenetic Alopecia
(男性型脱毛症:思春期以降の男性の進行性の脱毛症)の略です。


プロペシア®錠を処方された医療機関名

エー ジー エー


AGAは進行性です

エー ジー エー


AGAは進行性であり、放っておくとす毛が進んでいきます。抜け毛の進行を抑えることが重要です。



●頭頂部拡大イラスト (イメージ図)



プロペシア®はDHTの産生を阻害することで、抜け毛を減らし、AGA*の進行を抑えます。



*AGA(エージーエー)=男性型脱毛症

治療期間と期待される効果の目安

6ヵ月以上継続して服用することで、効果を実感します。

治療期間と期待される効果の目安

※改善の程度には個人差があります。

開始 ~3ヵ月

- 抜け毛の減少
- 生え際にうぶ毛が目立つ

治療満足度 低



~6ヵ月

- うぶ毛が太くなり、伸びる
- うす毛が目立たなくなり始める
- 周囲に人から「増えた?」と言われる

治療満足度 高



~1年

- 明らかな抜け毛の減少
- 後退していた生え際に前進
- 毛髪のボリュームを感じる
- 4人に1人が効果を実感
- 理・美容師に「増えた?」と言われる

治療満足度 高



佐藤明男 他 *Skin Surgery* 2007 ; 16(3): 126-131, より改変

プロペシア錠に関する Q & A

下記のQ&Aは参考情報ですので主治医にご相談ください。

Q どのくらいで効き始めますか？

A 治療の効果は、抜け毛が減ったかどうかが目安となり、その判断には、通常 6 ヶ月の服用が必要となります。

Q うす毛が改善したら服用をやめてもいいですか？

A 服用をやめると、再びうす毛が進行します。治療の継続については、主治医にご相談ください。

Q 服用時間は何時にすればいいですか？

A 食事の影響を受けませんので、食前、食後いつでも服用が可能です。忘れずに服用するには毎日決まった時間帯に服用することをおすすめします。

Q 頭皮につけるタイプの育毛剤・発毛剤と一緒に使えますか？

A 頭皮につけるタイプの育毛剤・発毛剤と一緒に使った場合の安全性について問題となった報告はありません。

Q かぜ薬など、他の薬と一緒に服用しても大丈夫ですか？

A 薬の飲み合わせが問題になったという報告はありませんが、主治医にご相談ください。

Q 女性は使えますか？

A 使えません。男性のみ服用してください。妊娠中の方がプロペシア®を服用すると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。

！プロペシア®錠のニセモノにご注意を！

医療用医薬品のニセモノの流通は、医薬品を使用される患者様、医療関係者を含む医療業界全体の大きな問題となっており、現在報告されているニセモノは製薬会社以外の別のところでつくられていることも多く、安全性が確認されていないものがあります。

ニセモノの主な流通経路は、インターネットなどでの個人輸入によるものと考えられており、ニセモノを服用した場合は思いがけない健康被害が発生する可能性があります。ニセモノを服用しないために、インターネットなどで安易に注文をせず、医療機関を受診して医師の処方により正しく服用することをお勧めします。



ニセモノとは？

- ！ 薬効成分（フィナステリド）が全く含まれていないもの
- ！ 過剰な薬効成分が含まれるもの
- ！ 薬効成分が少なすぎるもの
- ！ 錠剤自体にコンタミネーション（雑菌などの混入）の可能性のあるもの など

ご存知でしたか？

海外ニセモノ

海外において以下のようなフィナステリド（プロペシア®）錠のニセモノが発見されております。



*これら以外にも区別できない偽造品がある可能性があります。

フィナステリド（プロペシア®）錠国内正規品



プロペシア®錠1mg



プロペシア®錠0.2mg



AGA（エージーイー）に関する相談は、医療機関に受診していただき、適切な治療を行っていただくようお願いいたします。

！ 厚生労働省：個人輸入に関する注意

- 「個人輸入において注意すべき医薬品等について」
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/050609-1.html>
 - 「医薬品等を海外から購入しようとする方へ」
<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kojinyunyu/index.html>
- 個人輸入された医薬品による健康被害については、公的制度（医薬品副作用被害救済制度）の救済対象となりません。

プロペシア®錠の服用方法

この薬の使い方

● 1日1回、内服してください。

6ヵ月服用しても抜け毛が減らない場合は、医師にご相談ください。

● 男性成人のみ服用してください。

女性には効果が認められていません。妊娠中あるいは妊娠している可能性のある方及び授乳中の方は服用しないでください。(妊娠中の方がプロペシア®を服用すると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。)



● プロペシア®を割って飲まないでください。

妊娠中の方がプロペシア®を服用したり、破損したプロペシア®に触れて有効成分が吸収されたりすると、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。また、プロペシア®を割って服用した場合の安全性・有効性も保証されていません。なお、プロペシア®はコーティングされているので、通常の扱いにおいて有効成分に触れることはありません。



● 肝機能障害のある方は医師に相談してください。

プロペシア®は肝臓で代謝される薬です。服用中に肝機能異常がみられた報告があります。肝機能障害のある方は、プロペシア®を処方される医師にご相談ください。

● 家族や他の人にあげないでください。

プロペシア®の使用に際しては必ず医師または薬剤師にご相談ください。

● 小児の誤飲に注意してください。

小児の手の届かない所に保管してください。
他の容器に入れかえないでください。
(誤飲の原因となります)



この薬の副作用

国内で実施された臨床試験(1年間)において、4.0%(276例中11例)に副作用が認められています。主な症状はリビドー減退1.1%(3例)、勃起機能不全0.7%(2例)等でした。肝機能障害の症状があらわれる可能性があります。このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

その他

● 前立腺がんの検診を受ける予定のある方は、検査を実施される医師にプロペシア®を服用していることをお知らせください。

プロペシア®は、前立腺がん検査で測定されるPSA値を約50%低下させることが知られています。したがって、測定したPSA濃度を2倍した値を目安として評価してください。

● 日本赤十字社より以下の献血制限が行われています。

プロペシア®を服用中の方は献血ができません。
献血時に記入する問診票において、直近一ヵ月以内のプロペシア®服用の有無を確認する項目があります。

Memo

[illegible]