

## プロペシア錠 0.2mg プロペシア錠 1mg

### 【この薬は？】

|              |  |                                    |
|--------------|--|------------------------------------|
| 販売名          | プロペシア錠 0.2mg<br>PROPECIA Tablets 0.2mg | プロペシア錠 1mg<br>PROPECIA Tablets 1mg |
| 一般名          | フィナステリド<br>Finasteride                 |                                    |
| 含有量<br>(1錠中) | 0.2mg                                  | 1mg                                |

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、男性型脱毛症用剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、5 $\alpha$ -還元酵素Ⅱ型を選択的に抑制することによりテストステロンからジヒドロテストステロンへの変換を阻害し、発毛作用を示します。
- ・次の病気の人に処方されます。

#### 男性における男性型脱毛症の進行遅延

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

○次の人は、この薬を使用することはできません。

- ・過去にプロペシア錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- ・妊婦または妊娠している可能性のある人および授乳中の人

○次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。

- ・うつ病、うつ状態の人、または過去にうつ病、うつ状態のあった人、過去に自殺念慮または自殺企図のあった人
- ・肝臓に障害がある人

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

使用量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。

通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

| 販売名  | プロペシア錠 0.2mg | プロペシア錠 1mg |
|------|--------------|------------|
| 1 回量 | 1 錠          |            |
| 飲む回数 | 1 日 1 回      |            |

### ●どのように飲むか？

コップ 1 杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して 2 回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1 回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は 1 回とばして、次の時間に 1 回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

・この薬の使用に関して、十分に理解できるまで説明を受けてください。

-この薬を妊婦が飲むと、この薬の作用により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがあります。

-この薬を分割・粉砕しないでください。

もし、この薬が粉砕・破損された場合、妊婦または妊娠している可能性のある人および授乳中の人はこの薬を取り扱わないでください。この薬はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、この薬の成分に触れることはありません。

・この薬との関連性は明らかではありませんが、死んでしまいたいと感じる、自殺行動をおこす、自殺行動により死に至ってしまうなどの報告があります。死んでしまいたいと感じた場合あるいは自殺行動をおこした場合は、この薬の使用を中止し、医師に相談してください。

・この薬は、血清前立腺特異抗原\*（PSA）に影響を与えるので、前立腺癌等の検査において PSA の検査を受けるときは、この薬を飲んでいないことを検査を行う医師に伝えてください。

\*血清前立腺特異抗原（PSA）とは、前立腺癌のスクリーニングにおける重要な指標です。

- ・この薬は、効果が得られるまでにある程度の期間を要する場合があります。しかし、この薬を6ヵ月以上使用しても効果が得られない場合は、使用が中止されます。また、6ヵ月以上使用する場合であっても定期的に効果を確認し、継続使用の必要性について検討されます。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人および授乳中の人はこの薬を使用することはできません。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

### 副作用は？









特にご注意ください重大な副作用と、主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

| 重大な副作用              | 主な自覚症状                      |
|---------------------|-----------------------------|
| 肝機能障害<br>かんきのうしょうがい | 疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、食欲不振 |

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用の表をご覧ください。

| 部位  | 自覚症状               |
|-----|--------------------|
| 全身  | 疲れやすい、体がだるい、力が入らない |
| 口や喉 | 吐き気                |
| 腹部  | 食欲不振               |

### 【この薬の形は？】

| 販売名     | プロペシア錠 0.2mg  | プロペシア錠 1mg   |
|---------|---|--|
| PTP シート |    |    |
| 形状      | 円形・フィルムコーティング錠<br>   | 円形・フィルムコーティング錠<br>   |
| 直径      | 7.2mm   | 7.2mm  |
| 厚さ      | 3.5mm   | 3.5mm  |
| 色       | うすい赤色   |  |
| 識別コード   | MSD22   | MSD115   |

## 【この薬に含まれているのは？】

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 販売名  | プロペシア錠 0.2mg  | プロペシア錠 1mg |
| 有効成分 | フィナステリド   |            |
| 添加物  | 結晶セルロース、乳糖水和物、部分アルファー化デンプン、デンプングリコール酸ナトリウム、ジオクチルソジウムスルホサクシネート、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、タルク、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ |            |

## 【その他】

### ●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### ●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：オルガノン株式会社 (<https://www.organon.com/japan/>)  
カスタマーサポートセンター  
フリーダイヤル：0120-095-213  
受付時間：9：00～17：30  
(土日祝日・当社休日を除く)