

	5mg	10mg	20mg
承認番号	20300AMZ00735000	21300AMZ00847000	21300AMZ00848000
販売開始	1991年12月	2002年 6月	

貯法：室温保存  
有効期間：3年

HMG-CoA還元酵素阻害剤  
◎高脂血症治療剤◎

## 日本薬局方 シンバスタチン錠

リポバス<sup>®</sup>錠5  
リポバス<sup>®</sup>錠10  
リポバス<sup>®</sup>錠20

処方箋医薬品：注意一医師等の処方箋により使用すること

LIPOVAS<sup>®</sup> Tablets 5, 10, 20

ORGANON

### 2. 禁忌 (次の患者には投与しないこと)

- 2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 重篤な肝障害のある患者 [9.3.1 参照]
- 2.3 妊婦又は妊娠している可能性のある女性及び授乳婦 [9.5、9.6 参照]
- \*\*2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ボサコナゾール、アタザナビル、サキナビルメシル酸塩、コピシスタットを含有する製剤、セリチニブを投与中の患者 [10.1 参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	リポバス <sup>®</sup> 錠5	リポバス <sup>®</sup> 錠10	リポバス <sup>®</sup> 錠20
有効成分	日本薬局方 シンバスタチン		
分量	5mg	10mg	20mg
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、加水分解ゼラチン、クロスポビドン、クエン酸水和物、ブチルヒドロキシアニソール、ステアリン酸マグネシウム		

#### 3.2 製剤の性状

販売名	リポバス <sup>®</sup> 錠5	リポバス <sup>®</sup> 錠10	リポバス <sup>®</sup> 錠20	
剤形・色調	円形・裸錠・白色		楕円形・裸錠・白色	
外形	表面	 直径：6.4mm	 直径：8.0mm	 長径：14.0mm
	裏面	 短径：7.5mm		
	側面	 厚さ：2.4mm	 厚さ：3.0mm	 厚さ：4.6mm
識別コード	 726	 735	 740	

### 4. 効能又は効果

高脂血症、家族性高コレステロール血症

### 5. 効能又は効果に関連する注意

適用の前に十分な検査を実施し、高脂血症、家族性高コレステロール血症であることを確認した上で本剤の適用を考慮すること。本剤は高コレステロール血症が主な異常である高脂血症によく反応する。

### 6. 用法及び用量

通常、成人にはシンバスタチンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合は1日20mgまで増量できる。

### 7. 用法及び用量に関連する注意

服用時間：コレステロールの生合成は夜間に亢進することが報告されており、本剤の臨床試験においても、朝食後に比べ、夕食後投与がより効果的であることが確認されている。したがって、本剤の適用にあたっては、1日1回夕食後投与とすることが望ましい。

### 8. 重要な基本的注意

- 8.1 あらかじめ高脂血症治療の基本である食事療法を行い、更に運動療法や、高血圧・喫煙等の虚血性心疾患のリスクファクターの軽減等も十分考慮すること。
- 8.2 投与中は血中脂質値を定期的に検査し、治療に対する反応が認められない場合には投与を中止すること。
- 8.3 肝炎、黄疸等の肝機能障害があらわれることがある。また、まれに肝不全に至ることがあるので、定期的に肝機能検査等の観察を十分に行うこと。[11.1.3 参照]
- 8.4 血小板減少があらわれることがあるので、血液検査等の観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]

### 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

#### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

##### 9.1.1 アルコール中毒患者

本剤は主に肝臓において代謝され、作用するので肝障害を悪化させるおそれがある。

##### 9.1.2 横紋筋融解症があらわれやすいとの報告がある以下の患者

- ・甲状腺機能低下症の患者
- ・遺伝性の筋疾患（筋ジストロフィー等）又はその家族歴のある患者
- ・薬剤性の筋障害の既往歴のある患者
- ・アルコール中毒患者 [11.1.1 参照]

##### 9.1.3 重症筋無力症又はその既往歴のある患者

重症筋無力症（眼筋型、全身型）が悪化又は再発することがある。[11.1.8 参照]

#### 9.2 腎機能障害患者

##### 9.2.1 腎障害又はその既往歴のある患者

横紋筋融解症の報告例の多くが腎機能障害を有する患者であり、また、横紋筋融解症に伴って急激な腎機能の悪化が認められている。

##### 9.2.2 腎機能検査値異常のある患者

本剤とフィブрат系薬剤を併用する場合には、治療上やむを得ないと判断される場合のみ併用することとし、本剤の投与量は10mg/日を超えないこと。急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。やむを得ず併用する場合には、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状（筋肉痛、脱力感）の発現、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること。[10.2 参照]

#### 9.3 肝機能障害患者

##### 9.3.1 重篤な肝障害のある患者

投与しないこと。本剤は主に肝臓において代謝され作用するので肝障害を悪化させるおそれがある。[2.2 参照]



## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

#### 11.1.1 横紋筋融解症、ミオパチー（いずれも頻度不明）

筋肉痛、脱力感、CK上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特徴とする横紋筋融解症があらわれ、これに伴って急性腎障害等の重篤な腎障害があらわれることがある。また、ミオパチーがあらわれることがあるので、広範な筋肉痛、筋肉圧痛や著明なCK上昇などに注意すること。[9.1.2、9.8 参照]

#### 11.1.2 免疫介在性壊死性ミオパチー（頻度不明）

近位筋脱力、CK高値、炎症を伴わない筋線維の壊死、抗HMG-CoA還元酵素（HMGR）抗体陽性等を特徴とする免疫介在性壊死性ミオパチーがあらわれ、投与中止後も持続する例が報告されているので、患者の状態を十分に観察すること。なお、免疫抑制剤投与により改善がみられたとの報告例がある。

#### 11.1.3 肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）

まれに肝不全に至ることがある。[8.3 参照]

#### 11.1.4 末梢神経障害（頻度不明）

四肢の感覚鈍麻、しびれ感・冷感等の感覚障害、あるいは筋力低下等の末梢神経障害があらわれることがある。

#### 11.1.5 血小板減少（0.2%）

[8.4 参照]

#### 11.1.6 過敏症候群（頻度不明）

ループス様症候群、血管炎等を含む過敏症候群が報告されている。

#### 11.1.7 間質性肺炎（0.07%）

長期投与であっても、発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常等が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

#### 11.1.8 重症筋無力症（頻度不明）

重症筋無力症（眼筋型、全身型）が発症又は悪化することがある。[9.1.3 参照]

### 11.2 その他の副作用

	1%以上	1%未満	頻度不明
消化器		腹痛、嘔気、嘔吐、下痢、消化不良、食欲不振、便秘、腹部膨満感、口内炎	膵炎、鼓腸放屁、舌炎
肝臓	AST上昇、ALT上昇、LDH上昇、 $\gamma$ -GTP上昇	Al-P上昇、総ビリルビン値上昇	
皮膚		そう痒、発疹、蕁麻疹、脱毛、紅斑	光線過敏、扁平苔癬
筋肉	CK上昇、ミオグロビン上昇	筋肉痛、筋痙攣	
血液		白血球減少	貧血
精神神経系		頭痛、めまい、しびれ	不眠、認知機能障害（記憶障害、混乱等）、抑うつ
その他		倦怠感、BUN上昇、浮腫、関節痛、ほてり、胸痛、味覚異常、勃起不全、HbA1c上昇、血糖値上昇、テストステロン低下	心悸亢進、頻尿、口渇、耳鳴、発熱

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

## 15. その他の注意

### 15.1 臨床使用に基づく情報

海外において、本剤を含むHMG-CoA還元酵素阻害剤投与中の患者では、糖尿病発症のリスクが高かったとの報告がある。

## 16. 薬物動態

### 16.1 血中濃度

#### 16.1.1 単回投与

健康成人男性に2.5<sup>3)</sup>、5、10及び20mgを1回経口投与したとき、HMG-CoA還元酵素阻害活性より求めた血漿中薬物濃度は投与量に依存して増加し、投与後1.4~3.7時間で最高値に達した<sup>3)</sup>。

#### 16.1.2 連続投与時の蓄積性

健康成人に20mg 1日1回又は10mg 1日2回<sup>3)</sup>を7日間連続経口投与したとき、投与7日目の薬物動態パラメータは投与1日目と比較して有意な変動はみられず、蓄積性は認められなかった<sup>3)</sup>。

### 16.2 吸収

健康成人男性に2.5<sup>3)</sup>、5、10及び20mgを1回経口投与したとき、速やかに吸収された<sup>3)</sup>。

### 16.4 代謝

健康成人男性に2.5<sup>3)</sup>、5、10及び20mgを1回経口投与したとき、血漿中にはシンバスタチンとともに、活性代謝物としてオープンアシド体が確認された<sup>3)</sup>。

### 16.5 排泄

本剤の主排泄経路は胆汁排泄であると考えられ、健康成人男性に2.5<sup>3)</sup>、5、10及び20mgを1回経口投与したとき、投与後24時間までの総阻害物質の尿中排泄率は投与量の0.34~0.42%であった<sup>3)</sup>。

注) 本剤の承認された用法及び用量は、シンバスタチンとして5mgを1日1回経口投与である。なお、年齢、症状により適宜増減するが、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合は1日20mgまで増量できる。

## 17. 臨床成績

### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

#### 17.1.1 国内臨床試験（5~10mg/日投与）

国内で実施された臨床試験（二重盲検比較試験を含む）の総症例1,002例のうち、家族性高コレステロール血症患者170例を含む高脂血症患者545例に対し、本剤5~10mgを1日1回投与した臨床試験において、85.0%（463/545例）の有効率を示した。このうち最長27ヵ月まで投与した長期試験においても、本剤の優れた血清脂質改善効果及び安全性が認められ、有効率88.7%（134/151例）を示した。本剤の投与により血清総コレステロール及びLDL-コレステロールの著明な低下がみられ、HDL-コレステロールの上昇が認められた。また、高値のトリグリセライドに対しても低下作用が認められた。また、二重盲検比較試験により本剤の有用性が認められている<sup>4)~7)</sup>。

#### 17.1.2 国内第Ⅲ相臨床試験（5~20mg/日投与）

本剤5~20mgを1日1回投与した二重盲検比較試験において、10mg又は20mg投与群で用量依存的なLDL-コレステロールの低下がみられ、5mg 1日1回投与時に比較して明らかな増量効果が認められている。なお、用量間に安全性についての差異は認められなかった<sup>8)</sup>。

### 17.3 その他

#### 17.3.1 HMG-CoA還元酵素阻害剤の脂溶性・水溶性に基づく臨床的有効性及び安全性への影響

HMG-CoA還元酵素阻害剤の臨床における有効性及び安全性は、脂溶性又は水溶性に基づくものではない。即ち、生化学的性質、薬理作用、経口投与後の体内動態等から総合的に得られる結果である。臨床試験の結果から脂溶性、水溶性の違いにより筋、睡眠への影響等、安全性に差異がみられるとの確証は得られていない<sup>9)~12)</sup>。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

シンバスタチンは吸収後、コレステロール合成の主要臓器である肝臓に選択的に分布し、活性型のオープンアシド体に加水分解される。オープンアシド体はコレステロール生合成系の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素を特異的かつ拮抗的に阻害し、肝臓のLDL受容体活性を増強させることによって、血清総コレステロールを速やかにかつ強力に低下させる。

### 18.2 コレステロール合成阻害作用

*in vitro*においてシンバスタチンのオープンアシド体はHMG-CoA還元酵素を拮抗的に阻害した。シンバスタチンは各種培養細胞を用いた試験及びラットに経口投与した試験において [<sup>14</sup>C] 酢酸からの [<sup>14</sup>C] コレステロール合成を阻害した。また、ヒト肝癌細胞由来のHep G2細胞を用いた試験<sup>13)</sup>及びコレステロール負荷ウサギに経口投与した試験<sup>14)</sup>において、シンバスタチンは肝LDL受容体活性を増強させた。

### 18.3 脂質低下作用

シンバスタチンは経口投与によりイヌ、コレステロール負荷ウサギ<sup>14)</sup>、<sup>15)</sup>及びWHHLウサギ（ヒト家族性高コレステロール血症のモデル動物）の血清総コレステロールを有意に低下させた。シンバスタチンはウサギに投与したときLDL-コレステロール及びVLDL-コレステロールを有意に低下させた。また、コレステロール負荷ウサギにおいてシンバスタチン0.7mg/kg/日はプラバスタチン18mg/kg/日とほぼ同等の血清脂質低下作用を示した<sup>14)</sup>。

### 18.4 動脈硬化進展抑制作用

シンバスタチンは、コレステロール負荷ウサギにおける大動脈及び冠状動脈硬化の進展を有意に抑制し<sup>15)</sup>、また、WHHLウサギにおける黄色腫発生を抑制した。

### 18.5 外因性コレステロール吸収抑制作用

コレステロール負荷ウサギにおいてシンバスタチンを連続経口投与したとき、消化管からの [<sup>3</sup>H] コレステロールの吸収が抑制された<sup>16)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般名：シンバスタチン (Simvastatin)


化学名：(1*S*,3*R*,7*S*,8*S*,8*aR*)-8-{2-[(2*R*,4*R*)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2*H*-pyran-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8*a*-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoate

分子式：C<sub>25</sub>H<sub>38</sub>O<sub>5</sub>

分子量：418.57

性状：白色の結晶性の粉末である。アセトニトリル、メタノール又はエタノール (99.5) に溶けやすく、水にほとんど溶けない。

構造式：



## 20. 取扱い上の注意

開封後は湿気を避けて保存すること。

## 22. 包装

〈リボバス®錠5〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

〈リボバス®錠10〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

〈リボバス®錠20〉

100錠 [10錠 (PTP) × 10]

## 23. 主要文献

- 1) Niemi M. Pharmacogenomics. 2007 ; 8 : 787-802.
- 2) Niemi M. Clin Pharmacol Ther. 2010 ; 87 : 130-3.
- 3) 大多和昌克, 他. 臨床医薬. 1989 ; 5 : 1123-40.
- 4) 齋藤康, 他. 臨床医薬. 1989 ; 5 : 2041-74.
- 5) 板倉弘重, 他. 臨床医薬. 1989 ; 5 : 2011-40.
- 6) 中谷矩章, 他. 臨床医薬. 1989 ; 5 : 2627-53.
- 7) 馬淵宏, 他. 臨床医薬. 1990 ; 6 : 519-40.
- 8) 中谷矩章, 他. 臨床医薬. 2001 ; 17 : 1501-47.
- 9) Eckernäs SA, et al. Br J Clin Pharmacol. 1993 ; 35 : 284-9.
- 10) Bradford RH, et al. Arch Intern Med. 1991 ; 151 : 43-9.
- 11) The European Study Group. Am J Cardiol. 1992 ; 70 : 1281-6.
- 12) Di Veroli C, et al. Curr Ther Res. 1992 ; 52 : 1-6.
- 13) Nagata Y, et al. Biochem Pharmacol. 1990 ; 40 : 843-50.
- 14) Ishida F, et al. Biochim Biophys Acta. 1990 ; 1042 : 365-73.
- 15) Kobayashi M, et al. Jpn J Pharmacol. 1989 ; 49 : 125-33.
- 16) Ishida F, et al. Biochim Biophys Acta. 1988 ; 963 : 35-41.

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

オルガノン株式会社 カスタマーサポートセンター  
東京都港区南青山1-24-3  
フリーダイヤル 0120-095-213

## 26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

**オルガノン株式会社**  
東京都港区南青山1-24-3