

使用上の注意改訂のお知らせ

2026 年 9 月

処方箋医薬品^{注)}

HMG-CoA 還元酵素阻害剤 ◎高脂血症治療剤◎

日本薬局方 シンバスタチン錠

リポバス[®]錠 5/錠 10/錠 20

注意－医師等の処方箋により使用すること

このたび、標記製品の「使用上の注意」を以下のとおり改訂しましたのでお知らせいたします。

今後のご使用に際しましては最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

弊社製品のご使用にあたって、副作用等臨床上好ましくない事象をご経験の際には、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

オルガノン株式会社

《改訂概要》

改訂項目	改訂内容
2. 禁忌	2.4 項の併用禁忌の薬剤名に『ロナファルニブ』を追記し、『サキナビルメシル酸塩』を削除しました。
10. 相互作用 10.1 併用禁忌	10.1 併用禁忌の項の薬剤名に『ロナファルニブ：ゾキンヴィ』を追記し、『サキナビルメシル酸塩：インビラーゼ』を削除しました。

- ・今回の改訂内容は医薬品安全対策情報（DSU）No.349（2026 年 10 月）に掲載されます。
- ・改訂後の電子添文全文は、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ（<https://www.pmda.go.jp/>）ならびに弊社ホームページ（<https://organonpro.com/jp-jp/>）に掲載しております。
- ・添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を用いて、以下の GS1 バーコードを読み取ることで、PMDA ホームページ上の最新の電子添文等をご覧いただけます。



《改訂内容》

リポバス錠 5 / 錠 10 / 錠 20

改訂後	改訂前																		
2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1～2.3 略（変更なし） 2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、コビススタットを含有する製剤、セリチニブ、<u>ロナファルニブ</u>を投与中の患者〔10.1 参照〕	2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 2.1～2.3 略 2.4 イトラコナゾール、ミコナゾール、ポサコナゾール、アタザナビル、<u>サキナビルメシル酸塩</u>、コビススタットを含有する製剤、セリチニブを投与中の患者〔10.1 参照〕																		
10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと） <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕</td><td>急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。</td><td>これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。</td></tr><tr><td>アタザナビル： レイアタツ コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア <u>ロナファルニブ</u>： <u>ゾキンヴィ</u> 〔2.4 参照〕</td><td>横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。</td><td>これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。</td></tr></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。	アタザナビル： レイアタツ コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア <u>ロナファルニブ</u> ： <u>ゾキンヴィ</u> 〔2.4 参照〕	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。	10. 相互作用 10.1 併用禁忌（併用しないこと） <table><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr><tr><td>イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕</td><td>急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。</td><td>これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。</td></tr><tr><td>アタザナビル： レイアタツ <u>サキナビルメシル酸塩</u>： <u>インビラーゼ</u> コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア 〔2.4 参照〕</td><td>横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。</td><td>これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。</td></tr></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。	アタザナビル： レイアタツ <u>サキナビルメシル酸塩</u> ： <u>インビラーゼ</u> コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア 〔2.4 参照〕	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																	
イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。																	
アタザナビル： レイアタツ コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア <u>ロナファルニブ</u> ： <u>ゾキンヴィ</u> 〔2.4 参照〕	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。																	
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																	
イトラコナゾール： イトリゾール ミコナゾール： フロリード ポサコナゾール： ノクサフィル 〔2.4 参照〕	急激な腎機能悪化を伴う横紋筋融解症があらわれやすい。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。																	
アタザナビル： レイアタツ <u>サキナビルメシル酸塩</u> ： <u>インビラーゼ</u> コビススタットを含有する製剤： ゲンボイヤ プレジコビックス シムツーザ セリチニブ： ジカディア 〔2.4 参照〕	横紋筋融解症を含むミオパチー等の重篤な副作用が起きるおそれがある。	これらの薬剤は CYP3A4を阻害し、本剤の代謝が抑制される。																	

（____部：自主改訂、_____部：削除）

《改訂理由》

【自主改訂】

2. 禁忌

10. 相互作用 10.1 併用禁忌

- ・販売中止された『サキナビルメシル酸塩』を削除しました。
- ・相互作用の相手薬剤の電子添文との整合性を図り、強力な CYP3A4 阻害剤である『ロナファルニブ』を追記しました。

製品情報お問い合わせ先

オルガノン株式会社
東京都港区南青山1-24-3

オルガノン カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル 0120-095-213
<受付時間>9:00～17:30（土日祝日・当社休日を除く）

2026 年 9 月
改訂連絡番号：26-03